



Gebrauchsfertiges, gefärbtes Hautantiseptikum mit mindestens 24 Stunden Langzeitwirkung

Einwirkzeit vor Eingriffen an talgdrüsenreicher Haut: 2 Min.

kodan® Tinktur forte gefärbt

Unser Plus

- Langzeitwirkung über mindestens 24 Stunden
- Breites antiseptisches Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, levurozid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV)
- Orange-rote Färbung zur Kennzeichnung des desinfizierten Hautbereiches
- Sehr schneller Wirkungseintritt und sehr gute Hautverträglichkeit

Anwendungsgebiet

- Insb. zur präoperativen Hautantiseptik
- Vor Katheterisierungen, Injektionen und Blutentnahmen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen und Biopsien

Anwendungsgebiete	Einwirkzeit
Talgdrüsenarme Haut: Vor Injektionen und Blutentnahmen (gemäß VAH)	15 Sek.
Talgdrüsenarme Haut: Zur prä- und postoperativen Hautdesinfektion (gemäß VAH)	60 Sek.
Talgdrüsenarme Haut: Vor Gelenkpunktionen (gemäß VAH)	60 Sek.
Talgdrüsenreiche Haut (gemäß VAH)	2 Min.

Anwendungshinweise

Vor allen invasiven Eingriffen

- kodan® unverdünnt anwenden
- Betreffendes Hautareal besprühen oder alternativ mit einem

getränkten Tupfer aufbringen

- Vollständige Benetzung der Haut sicherstellen und Einwirkzeiten gemäß des Anwendungsgebietes beachten
- Überschüssiges Präparat aufnehmen, um eine Pfützenbildung zu vermeiden

Bei präoperativer Hautantiseptik

- Haare an der betroffenen Hautstelle mechanisch kürzen oder chemisch entfernen
- Grundsätzliche präoperative Waschungen (z.B. mit octenisan®) werden empfohlen
- Bei Verwendung von Inzisionsfolien vor dem Aufkleben der Folie auf eine ausreichende Abtrocknung achten, um die Haftung nicht zu beeinträchtigen
- Um das Verwischen von Hautmarkierungen zu vermeiden, ausschließlich Hautmarkierungsstifte mit einer ausreichenden Alkoholbeständigkeit verwenden

Mikrobiologische Wirksamkeit

	Testmethode	Einwirkzeit
Bakterien, Hefen und Mykobakterien		
bakterizid	EN 13727	15 Sek.
MRSA	EN 13727	15 Sek.
mykobakterizid	EN 14348	1 Min.
levurozid	EN 13624	15 Sek.
Viren		
Herpes simplex-Virus	EN 14476	15 Sek.*
Adenovirus (Typ 5)	EN 14476	10 Min.*

kodan® Tinktur forte gefärbt

Mikrobiologische Wirksamkeit

	Testmethode	Einwirkzeit
Viren		
Rotavirus	EN 14476	30 Sek.
begrenzt viruzid	EN 14476	15 Sek.*

Angaben aller Konzentrationen unter hoher organischer Belastung
*geringe Belastung

Zertifikate / Normen



Wirksamkeit gegen Adenovirus: in Anlehnung an EN14476 (25°C)

Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten arzneilich wirksame Bestandteile:
45 g 2-Propanol (Ph.Eur.), 10 g 1-Propanol (Ph.Eur.), 0,2 g Biphenyl-2-ol

Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), Chinolingelb, Gelborange S, Brillantschwarz BN, gereinigtes Wasser

Chemisch-physikalische Daten

Farbe	braun
Dichte	ca. 0,90 g/cm ³ / 20 °C
Flammpunkt	24 °C / Methode: DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
Geruch	nach Alkohol

Besondere Hinweise

Zur äußeren Anwendung auf intakter Haut. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Produkt soll aufgrund des hohen Alkoholanteils nicht bei Frühgeborenen und Neugeborenen mit unreifer Haut (z.B. eingeschränkte Barrierefunktion der Haut) angewendet werden. Entzündlich. Nicht in Kontakt mit Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen. Bei der Benutzung von Thermokautern oder anderen elektrischen Geräten auf eine ausreichende Abtrocknung achten. Nach Anbruch des Arzneimittels nicht länger als 12 Monate, jedoch nicht über das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum hinaus anwenden.

Bei Verwendung vor Glukose-Testungen (z. B. Hämogluco-Sticks) Präparat gut abtrocknen lassen, um eventuelle Beeinträchtigungen der Messergebnisse zu vermeiden.

Bei Verwendung von Inzisionsfolien vor dem Aufkleben der

schülke +

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt |
Deutschland
Tel. +49 40 52100-666
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Folie auf eine ausreichende Abtrocknung achten, um die Haftung nicht zu beeinträchtigen.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	GTIN	PZN	Art.-Nr.
kodan® Tinktur forte gefärbt 1 l Flasche	10 / Karton(s)	4032651048045	6099531	104804
kodan® Tinktur forte gefärbt 250 ml Flasche	10 / Karton(s)	4032651048021	2335561	104802

Anwendungshilfen

Artikel	Art.-Nr.
Wandhalterung Kunststoff 1l	134416

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen und sicheren Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



kodan® Tinktur forte gefärbt

Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph. Eur.), 1-Propanol (Ph. Eur.), Biphenyl-2-ol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten 45,0 g 2-Propanol (Ph. Eur.), 10,0 g 1-Propanol (Ph. Eur.), 0,20 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Chinolingelb, Gelborange S, Brillantschwarz BN, Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:**

Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a., zur Nahtversorgung, sowie zur Unterstützung allgemeiner hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankungen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Stand 04/20

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.